

## Énoncé

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = e^{-x} \ln(e^{2x} - 1)$ . On cherche l'ensemble des primitives de  $f$  sur  $]0; +\infty[$ . On peut utiliser l'intégration par parties. L'énoncé propose une autre méthode qui, en fait, n'est différente qu'en apparence.

1. Démontrer que la fonction  $f$  est solution de l'équation différentielle  $y' + y = \frac{2e^x}{e^{2x} - 1}$ .
2. Démontrer que quel que soit  $x \in \mathbb{R}^*$ ,  $\frac{2e^x}{e^{2x} - 1} = \frac{e^x}{e^x - 1} - \frac{e^x}{e^x + 1}$ .
3. Dédurre des questions précédentes l'ensemble des primitives de la fonction  $f$  sur  $]0; +\infty[$ .

### La bonne méthode

1. Il s'agit de démontrer que quel que soit  $x > 0$ ,  $f'(x) + f(x) = \frac{2e^x}{e^{2x} - 1}$ .
2. Le plus simple est de montrer que l'expression de droite est égale à l'expression de gauche. On peut également effectuer la différence des deux expressions et montrer que celle-ci est nulle.
3. Toute primitive de la dérivée d'une fonction est... Par ailleurs, une primitive d'une fonction s'écrivant sous la forme  $\frac{u'}{u}$  est  $\ln |u|$ .